

Als de logopedische behandeling plaatsvindt in een instelling, maakt deze deel uit van de bedprijs of dagbehandelingstarief.

Het onderzoek en de behandeling voor afasie worden als regel vergoed door de zorgverzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.



Logopedie

LOGOPEDIE | Kyra Schenk-van Rossum
Logopediste

Irisstraat 2-03
7471 AV Goor
0547-271942
b.g.g. 06-39428522





Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel. Dit hersenletsel kan veroorzaakt worden door een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie komt meestal voor bij oudere mensen, maar ook bij jongeren kan een hersenletsel ontstaan met afasie als gevolg.

Mensen met een afasie hebben problemen met het begrijpen van gesproken taal, het spreken, het lezen en het schrijven. Er zijn verschillende soorten afasie, afhankelijk van de ernst en combinatie van verschijnselen.

Iemand met afasie begrijpt soms niet wat er tegen hem gezegd wordt, of hij vangt alleen de trefwoorden op en bedenkt zelf een verband hiertussen.

Vooraf bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op, waardoor de communicatie wordt verstoord.

Soms zegt een afasiepatiënt een ander woord dan hij bedoelt. Ook kan hij moeite hebben met het maken van zinnen. Dan kan het voor de omgeving moeilijk zijn hem te begrijpen. Ook dat kan de communicatie verstoren.

Het lezen van een boek of het volgen van ondertiteling op de televisie is vaak heel moeilijk of onmogelijk. Problemen met schrijven maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren of bij het telefoneren.

Wat doet de logopedist?

Via de huisarts, neuroloog of revalidatiearts wordt de patiënt naar een logopedist verwezen. Deze zal eerst een onderzoek betreffende de taal en/of de communicatie afnemen. De daarop volgende behandeling is erop gericht om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en de directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier dan vroeger met elkaar kunnen communiceren.

Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van vele factoren en is daarom moeilijk voorspelbaar. Wel is het zo dat de meeste verbetering optreedt in de eerste drie maanden van het herstel.